

# Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1977

GÖRAN PALMQVIST

Palmqvist, G.: Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1977. [Interesting finds of Macrolepidoptera in Sweden in 1977.] – Ent. Tidskr. 99:65–67 (1978). Lund, Sweden 15 June 1978. ISSN 0013-886x.

A list of 43 new provincial records of Macrolepidoptera found in Sweden is given. One species viz. *Anaitis praeformata* Hb. is recorded for the first time from the country. Also mentioned are finds of rare or otherwise interesting species.

G. Palmqvist, Smedvägen 15, S-136 44 Handen, Sweden.

I denna lista anmäls 43 nya landskapsfynd. Fyndet av *Anaitis praeformata* Hb. är dessutom nytt för landet. Även uppgifter om äldre opublicerade landskapsfynd är medtagna, då dessa inte blivit införda i den reviderade upplagan av Catalogus Insectorum Sueciae, Macrolepidoptera, som beräknas utkomma till sommaren 1978 och kan beställas genom Entomologiska Föreningen i Stockholm. Årtalen för de äldre fynden anges förkortat, t.ex. 1975 skrivs (75).

Nya utbredningsuppgifter, som genom den ovan nämnda nya Catalogus blir lättare att kontrollera, liksom rapporter av sällsyntare arter och invandrare, mottas med tacksamhet. Rapporterna bör vara mig tillhanda innan årets slut för att hinna komma in i nästa årslista. Mitt varma tack till alla som bidragit till att göra denna sammanställning möjlig.

## Art ny för landet

*Anaitis praeformata* Hb. Upl, Häverö 1 ex. 12.8 (TSS). Artens kännetecken och omständigheterna kring fyndet har beskrivits av Torstenius (1978).

## Nya landskapsfynd

*Gluphisia crenata* Esp. Vg (BEF 70). – *Leucodonta bicoloria* Schiff. Boh (BEF 71). – *Cosmotriche potatoria* L. Vg (SNT 72). – *Dasychira abietis* Schiff. Hls, Lindefallet 25.7 (SNT). – *Dasychira pudibunda* L. Boh (BEF 71). – *Lymantiria monacha* L. Hls, Skenstaviken 4.9 (SNT). – *Apatele strigosa* Schiff. Gtl, Fide (SVN). – *Pro-*

*texarnis depuncta* L. Vg, Askim (ELH). – *Anomogyna speciosa* Hb. Boh (BEF 69). – *Noctua subsequa* Schiff. Hls (GPT). – *Eriopygodes imbecilla* F. Nrk (HDT). – *Orthosia miniosa* Schiff. Hall (SVN). – *Cucullia artemisiae* Hfn. Gtl, Hörsne 1 ex. 30.7 (JTF). – *Cucullia chamomillae* Schiff. Nrk (HDT). – *Xylocampa areola* Esp. Hall (SVN). – *Agrochola macilenta* Hb. Vstm (BEF 70) och senare (LKH). – *Cirrhia ocellaris* Bkh. Bl (BEF 76). – *Porphyrinia noctualis* Hb. Hall (SVN). – *Nycteola degenerana* Hb. Öl (BEF 71). – *Sterrhia deversaria* H. S. Hall (SVN 76). – *Acasis viretata* Hb. Dlsl (SVN). – *Lampropteryx suffumata* Schiff. Dlsl (SVN). – *Sparganina luctuata* Schiff. Hall (KUR). – *Epirrhoe pupillata* Thnbg. Nrk, Göksholm 11.7 (WHS). – *Epirrhoe rivata* Hb. Dlsl (SVN 76) – *Perizoma taeniata* Steph. Hall, Vindrap (KUR). – *Hydriomena ruberata* Frr. Gtl (SVN). – *Eupithecia abietaria* Goeze (*pini* Retz). Hall (KUR). – *Eupithecia egenaria* H.S. Öl, Västerstad 17.6 (BÅB).

*Horisme aemulata* Hb. Gtl, Buttle 1 ex. 20.7 (EQT). I Sverige tidigare endast känd från Gotska Sandön.

*Ligdia adustata* Schiff. Hall (SVN). – *Ourapteryx sambucaria* L. Upl, Wärmdö 1 ex. 4.8 (IMB). – *Ennomos quercinaria* Hfn. Öl, Västerstads almskog (BEF, GPA). – *Erannis leucophaearia* Schiff. Hall (KUR 75). – *Cleora secundaria* Esp. Boh (SVN). – *Ectropis crepuscularia* Schiff. Hall (SVN 76). – *Gnophos sordaria* Thnbg. Sk, Osby (KMS 70). – *Selidosoma plu-*

*maria* Schiff. Sdm, Sorunda flera ex (PRG 76). – *Acanthopsyche atra* L. Boh (KSM 72). – *Bembecia scopigera* Scop. Dlr, Mora flera ex. (CBJ 76).

*Aegeria flaviventris* Stgr. Upl, Barkaby flygplats 1 ex., kläckt från larv funnen 25.5 i *Salix caprea*. Även flera äldre galler funna (IMB). Arten är tidigare i landet endast funnen i Hall och upptäcktes så sent som 1975 (Svensson 1977:122). Då *flaviventris* förekommer i södra Finland finns misstanken om att förekomsten i Upl skulle kunna härstamma från en sentida invandring österifrån.

*Hepialus lupulinus* L. Boh (BEF 67).

### Övriga fynduppgifter

*Iphiclides podalirius* L. Gtl, Othem 1 ex. observerat 3.8 på nära håll. Enligt uppgiftslämnaren (Bo Landberg) kan ej förväxling med *Papilio machaon* L. ha skett (LNB). Tidigare uppgiven från ön, men denna äldre uppgift (1849) har ansetts som mycket osäker (Nordström 1955).

*Poliobrya umovii* Ev. Dlr, Floda. Tagen i bortbåt 100 ex. under tiden 4.7–9.7, med maximal flygning 7.7. Lokalen är densamma som förra året (flera samlare) (Svensson 1977).

*Actebia fennica* Tausch. Denna sporadiskt uppträdande art (förra året bl.a. massförekomst i Hls) endast rapporterad i 1 ex. 22.8 Öl, Västerstads almskog (HHL).

*Hadena irregularis* Hfn. Är funnen på Öl i åtminstone 100 ex. (flera samlare), från trakten av Vickleby över Stora Alvaret till Gösslunda, alltid i anslutning till artens värdväxt, såpört. De flesta fjärilarna är håvade i skymningen på blommor (framförallt smällglim) efter vägkanterna mot alvaret. Flygtid från 17.6 till mitten av juli med högflygning omkring 25.6.

*Lasionycta skraelingia* H.S. Dlr, Floda 2 ex. (avflugna honor) 5.7 och 7.7. Det ena av de två exemplaren fångades flygande i skymningen och det andra togs sittande på en tallstam (HAD). Värt att notera är att *skraelingia* hitintills i Dlr endast anträffats udda år (1965, 1973, 1977).

*Leucania albipuncta* Schiff. Denna sällsynta art togs i Sk, Backåkra, Hagestad 1 ex. 21.8 (IMB), Sandhammaren 1 ex. på bete 2.9 (SVN) samt samma kväll 1 ex. Backåkra strand (BÅB).

*Apamea zollikoferi* Frr. Öl, Bejershamn 1 ex. 17.9.1976 (LTS). Fyndet är det femte av arten i samband med den invasion som skedde i slutet av sept. och början av okt. 1976. Från Sk rapporterades 4 ex. (Palmqvist 1977).

*Cosmia affinis* L. Öl, Kastlösa, Västerstads almskog. Arten tagen från 11.8 till början av sept. (flera samlare).

*Lithacodia deceptor* Scop. Sk, Börringe Gärdslöv 1 ex. 10.6 och 2 ex. 16.6 (HHL). Senare togs på samma lokal 1 ex. i början av juli (WMA). Dessa fynd är ytterligare belägg för en förekomst i södra Sk (Svensson 1977).

*Madopa salicalis* Schiff. Öl, Böda Abbekärr 1 ex. 23.6 (TRF) och Sk, Backåkra, Hagestad 1 ex. 25.6 (KSM).

*Cossus terebra* Schiff. Sm, Alsterbro 36 ex. huvudsakligen tagna 16.7–23.7 men även funnen i början av aug. på samma plats (flera samlare). Arten har vidsträckt utbredning i landet men har oftast anträffats enstaka. Rapporten är den första i Sverige av *terebra* i större antal på samma lokal.

### Litteratur

- Nordström, F. 1955. De fennoskandiska dagfjärilarnas utbredning. Lepidoptera. Diurna. (Rhopalocera & Hesperioidea.) Lund.  
 Palmqvist, G. 1977. Intressantare fynd av Macrolepidoptera i Sverige 1976. – Ent. Tidskr. 98:31–33.  
 Svensson, I. 1977. Förändringar i Sveriges storfjärilfauna en tredje tioårsperiod (Lepidoptera). – Ent. Tidskr. 98:113–122.  
 Torstenius, S. 1978. *Anaitis praeformata* tagen i Sverige (Lep., Geometridae). – Ent. Tidskr. 99:11–12.

### Rapportörer

BEF	Christer Bergendorff
BÅB	Bengt Åke Bengtsson
CBJ	Björn Cederberg
ELH	Claes Eliasson
EQT	Håkan Elmquist
GPA	Göran Palmqvist

GPT Peter Gustavsson  
HAD Hans Hedin  
HDT Stig Höglund  
HHL Hans Hellberg  
IMB Lars Imby  
JTF Thorulf Janson  
KMS Arne Klementsson  
KSM Peter Koch-Schmidt  
KUR Lars Kullmar  
LKH Hans Lindmark

LNB Kurt Landberg  
LTS Mats Lindeborg  
PRG Gunnar Persson  
SNT Thure Svensson  
SVN Ingvar Svensson  
TRF Gunnar Träff  
TSS Stig Torstenius  
WHS Sten Wahlström  
WMA Magnus Wedelin